

大腸がん

レジメン名	1クール	投与日 (day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
レジメン名	mFOLFOX6	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	中等度
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	
	FOLFIRI	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	中等度
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間	
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	
	XELOX	21日	1 1タ-15朝	オキサリプラチン カペシタビン	130mg/m ² 1000mg/m ² /回 1日2回	2時間 内服	中等度
	SOX	21日	1 1タ-15朝	オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	130mg/m ² 80mg/m ² /日 分2	2時間 内服	中等度
	IRIS	28日	1	イリノテカン	100mg/m ²	1.5時間	中等度
			1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服	
	sLV5FU2	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	軽度
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	
フルオロウラシル				2400mg/m ²	46時間		
CPT-11(150)	14日	1	イリノテカン	150mg/m ²	1.5時間	中等度	
BV併用			ペバシズマブ		*初回 1.5時間 2回目 1時間 以降 30分		
	BV+Capecitabine	21日	1	ペバシズマブ	7.5mg/kg	*	軽度
			1タ-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服	
	BV+XELOX	21日	1	ペバシズマブ	7.5mg/kg	*	中等度
			1タ-15朝	オキサリプラチン カペシタビン	130mg/m ² 1000mg/m ² /回 1日2回	2時間 内服	
	【3週間】BV+IRIS	21日	1	ペバシズマブ	7.5mg/kg	*	中等度
			1タ-15朝	イリノテカン テガフル・ギメラシル・オテラシル	150mg/m ² 80mg/m ² /日 分2	1.5時間 内服	
	【4週間】BV+IRIS	28日	1, 15	ペバシズマブ	5mg/kg	*	中等度
			1タ-15朝	イリノテカン テガフル・ギメラシル・オテラシル	100mg/m ² 80mg/m ² /日 分2	1.5時間 内服	
	BV+SOX	21日	1	ペバシズマブ	7.5mg/kg	*	中等度
			1タ-15朝	オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	130mg/m ² 80mg/m ² /日 分2	2時間 内服	
	BV+mFOLFOX6	14日	1	ペバシズマブ	5mg/kg	*	中等度
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間	
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	
フルオロウラシル				400mg/m ²	5分		
フルオロウラシル				2400mg/m ²	46時間		

	BV+FOLFIRI	14日	1	ペバシズマブ	5mg/kg	*	中等度	
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	BV+sLV5FU2	14日	1	ペバシズマブ	5mg/kg	*	軽度	
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	BV+FOLFOXIRI	14日	1	ペバシズマブ	5mg/kg	*	中等度	
				イリノテカン	150mg/m ²	1.5時間		
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	BV+TAS-102	28日	1,15	ペバシズマブ	5mg/kg	*	軽度	
			1-5, 8-12	トリフルリジン・チピラシル	70mg/m ² /日 分2	内服		
	BV+XELIRI	21日	1	ペバシズマブ	7.5mg/kg	*	中等度	
				イリノテカン	200mg/m ²	1.5時間		
				1タ-15朝	カペシタビン	800mg/m ² /回 1日2回		
BV+UFT/LV	28日	1,15	ペバシズマブ	5mg/kg	*	軽度		
		1-21.	テガフル・ウラシル	300mg/m ² /日	内服			
		1-21.	ホリナート	75mg/日				
Cmab併用	Cmab単剤	7日	1	セツキシマブ	** (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ²	**2時間 1時間	最小度	★【1回目専用】【2回目以降】レジメン有
	Cmab+mFOLFOX6	14日	1,8	セツキシマブ	**	**	中等度	
			1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
Cmab+FOLFIRI	14日	1,8	セツキシマブ	**	**	中等度		
		1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間			
			イリノテカン	150mg/m ²	2時間			
			フルオロウラシル	400mg/m ²	5分			
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間			
Cmab+CPT-11	28日	1,8,15,22	セツキシマブ	**	**	中等度	★	
Cmab+Encorafenib +Binimetinib	7日	1	セツキシマブ	**	**	中等度		
		1-7.	エンコラフェニブ	300mg/回	1日1回			
		1-7.	ビニメチニブ	45mg/回	12時間毎			

Pmab併用	Pmab単剤	14日	1	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	最小度	
	Pmab+mFOLFOX6	14日	1	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	中等度	
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	Pmab+FOLFIRI	14日	1	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	中等度	
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	Pmab+CPT-11	28日	1,15	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	中等度	
イリノテカン				150mg/m ²	1.5時間			
AFL併用	AFL+FOLFIRI	14日	1	アフリベルセプト	4mg/kg	1時間	中等度	
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
RAM併用	RAM+FOLFIRI	14日	1	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間(2回目以降30分)	中等度	
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	【3週間】Pembrolizumab	21日	1	ペンブロリスマブ	200mg/body	30分	最小度	
	【6週間】Pembrolizumab	42日	1	ペンブロリスマブ	400mg/body	30分	最小度	
	PER/HER	21日	1	ペルツズマブ	※初回:840mg/body 以降:420mg/body	※※初回:1時間 以降:30分	最小度	
				トラスツズマブ	(初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg	(初回)1.5時間 (2回目以降)30分		

☆【初回専用】【2回目以降】【2回目以降/HER初回投与量】の3レジメン

胃がん

レジメン名	1クール	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考		
S-1/CDDP	35日	1-21.	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服	高度			
		8	シスプラチン	60mg/m ²	2時間				
	S-1/DTX (40) 【術後補助】	21日	1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		軽度	(1コース目)S-1単剤(2投1休) (2~7コース目)S-1(2投1休)、 DTX(day1) (8コース目以降)S-1単剤(4投2休)
			1	ドセタキセル	40mg/m ²	1時間			
	PTX	28日	1,8,15	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間		軽度	
	CPT-11(150)	14日	1	イリノテカン	150mg/m ²	1.5時間		中等度	
	SOX	28日	1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間		中等度	
1タ-15朝			テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服				
XELOX	21日	1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	中等度			
		1タ-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服				
mFOLFOX6	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	中等度			
			オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間				
			フルオロウラシル	400mg/m ²	5分				
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間				
HER併用	HER/Xeloda/CDDP	21日	1	トラスツズマブ	(初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg	(初回)1.5時間 (2回目以降)30分	高度	★【初回専用】 【2回目以降専用】有	
				シスプラチン	80mg/m ²	2時間			
		1タ-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服				
	HER/SOX	21日	1	トラスツズマブ	(初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg	(初回)1.5時間 (2回目以降)30分	中等度		
				オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間			
				1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2			内服
HER/XELOX	21日	1	トラスツズマブ	(初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg	(初回)1.5時間 (2回目以降)30分	中等度	★		
			オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間				
		1タ-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服				
RAM併用	RAM単剤	14日	1	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間(2回目以降30分)	最小度		
	RAM/PTX	28日	1,15	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間(2回目以降30分)	軽度		
			1,8,15	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間			
RAM/nab-PTX	28日	1,15	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間(2回目以降30分)	軽度			
		1,8,15	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	30分				
RAM+TAS-102	28日	1,15	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間(2回目以降30分)	中等度			
		1-5, 8-12	トリフルリジン・チピラシル	35mg/m ² /回 1日2回	内服				
T-DXd	21日	1	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	初回:1.5時間 以降:30分	中等度			

Nivolumab 併用	【2週間】Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度		
	【4週間】Nivolumab	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度		
	Nivolumab/SOX	21日	1	ニボルマブ	360mg/day	30分	中等度		
			1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間			
		1タ-15朝		テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服			
	Nivolumab/XELOX	21日	1	ニボルマブ	360mg/day	30分	中等度		
			1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間			
			1タ-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服			
	Nivolumab/mFOLFOX6	14日	1		ニボルマブ	240mg/body	30分	中等度	【点滴用】【バクスター用】レジメン有
					レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
					オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
					フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
					フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		

食道がん

レジメン名	1クール	投与日(day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考	
DCF【進行再発】	28日	1,15	ドセタキセル	30mg/m ²	1時間	高度		
		1-5.	フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間			
		1	シスプラチン	80mg/m ²	2時間			
	DTX	21日	1	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	軽度	
	mFOLFOX6	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	中等度	
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
フルオロウラシル				2400mg/m ²	46時間			
PTX	49日	1,8,15,22,29,36	パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	軽度		
Nivo	(2週間)Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
	(4週間)Nivolumab	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度	
	(2週間)Nivolumab【術後】	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	12ヶ月間まで
	(4週間)Nivolumab【術後】	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度	12ヶ月間まで
	Nivolumab+Ipilimumab	42日	1,22	ニボルマブ	360mg/body	30分	最小度	
1			イピリムマブ	1mg/kg	30分			
Pembro	(3週間)Pembrolizumab	21日	1	ペンブロリスマブ	200mg/body	30分	最小度	
	(6週間)Pembrolizumab	42日	1	ペンブロリスマブ	400mg/body	30分	最小度	

肝胆膵がん

レジメン名	1クール	投与日 (day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
Atezolizumab+BV	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回)60分 (2回目以降)30分	最小度	
			ベバシズマブ	15mg/kg	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分		
Durvalumab + Tremelimumab	28日	1	トレメリムマブ	300mg/body	1時間	最小度	Tremelimumabは初回1回のみ
		1	デュルバルマブ	1500mg/body	1時間		
Durvalumab	28日	1	デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	最小度	
CDDP/GEM	21日	1,8	シスプラチン	25mg/m ²	1時間15分	中等度	
			ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分		
GEM+S-1	21日	1,8	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	中等度	
		1-14.	テガフル・ギメラシル・オテラシル	60-100mg/m ² /日 分2	内服		
Durvalumab+CDDP+GEM	21日	1	デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	中等度	
		1,8	シスプラチン	25mg/m ²	1時間		
		1,8	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分		
Erlotinib+GEM	28日	1,8,15	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	軽度	
		1-28.	エルロチニブ	100mg/day	内服		
Modified FOLFIRINOX	14日	1	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	高度	【点滴用】【バクスター用】レジメン有
			イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
			レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
			フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
GEM	28日	1,8,15	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	軽度	
【術前】GEM+S-1	21日	1,8	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	軽度	
		1-14.	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
GCS (GEM+CDDP+S-1)	14日	1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	中等度	
		1	シスプラチン	25mg/m ²	1時間15分		
		1-7.	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
nab-PTX/GEM	28日	1,8,15	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	30分	軽度	
			ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分		
nal-IRI+5FU/LV	14日	1	イリノテカン(リポソーム製剤)	70mg/m ²	90分	中等度	
			レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
RAM	14日	1	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間(2回目以降30分)	最小度	
肝動注	7日	1	フルオロウラシル	500mg/body	2時間		
			シスプラチン	10mg/body	1時間		
			フルオロウラシル	500mg/body	2時間		
			シスプラチン	10mg/body	1時間		
	7日	1	フルオロウラシル	500mg/body	2時間		

その他

膵・消化管神経内分泌腫瘍

レジメン名	1クール	投与日(day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
(weekly) STZ(1000)	7日	1	ストレプトゾシン	1000mg/m ²	30分	高度	
(weekly) STZ(1250)	7日	1	ストレプトゾシン	1250mg/m ²	30分	高度	増量基準あり
(weekly) STZ(1500)	7日	1	ストレプトゾシン	1500mg/m ²	30分	高度	増量基準あり

小腸癌

mFOLFOX6	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	中等度	【点滴用】【バクスター用】レジメン有
			オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
			フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		