

## 頭頸部がん

レジメン名	1クール	投与日(day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考	
Cmab併用	Cmab単剤	7日	1	セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup>	2時間	最小度	★【初回用】と【2回目以降】の2レジメン作成
					以降250mg/m <sup>2</sup>	1時間		
	Cmab+5-FU/CBDCA	21日	1,8,15	セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup>	2時間	中等度	★
					以降250mg/m <sup>2</sup>	1時間		
					1	カルボプラチン		
	Cmab+5-FU/CDDP	21日	1,8,15	セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup>	2時間	高度	★
					以降250mg/m <sup>2</sup>	1時間		
					1	シスプラチン		
	Cmab+weekly PTX	28日	1,8,15,22	セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup>	2時間	軽度	★
					以降250mg/m <sup>2</sup>	1時間		
1,8,15,22			パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	1時間			
	(2週間) Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
	(4週間) Nivolumab	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度	
	PTX	49日	1,8,15,22,29,36	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	1時間	軽度	
	(3週間) Pembrolizumab	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	最小度	
	(6週間) Pembrolizumab	42日	1	ペンブロリズマブ	400mg/body	30分	最小度	
	HER+DTX	21日	1	トラスツズマブ	初回8mg/kg	1.5時間	軽度	★
以降6mg/kg			30分					
		1	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup> , 75歳以上は55mg/m <sup>2</sup>	1時間			