

腎細胞がん

レジメン名	1クール	投与日(day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
Avelumab+Axitinib	14日	1	アベルマブ	10mg/kg	1時間	軽度	
		連日	アキシチニブ	5mg/回 1日2回	内服		
【2週間】Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
【4週間】Nivolumab	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度	
【2週間】Nivolumab+Cabozantinib	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	中等度	
		連日	カボザンチニブ	40mg/回 1日1回	内服		
Nivolumab+Ipilimumab	21日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
			イピリムマブ	1mg/kg	30分		
【6週間】Pembrolizumab(術後)	42日	1	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	最小度	
【3週間】Pembrolizumab(術後)	21日	1	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	最小度	
【3週間】Pembrolizumab+Axitinib	21日	1	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	軽度	
		連日	アキシチニブ	5mg/回 1日2回	内服		
【6週間】Pembrolizumab+Axitinib	42日	1	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	軽度	
		連日	アキシチニブ	5mg/回 1日2回	内服		
【3週間】Pembrolizumab+Lenvatinib	21日	1	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	中等度	
		連日	レンパチニブ	20mg/回 1日1回	内服		
Temsirolimus	7日	1	テムシロリムス	25mg/body	1時間	最小度	