

頭頸部がん

レジメン名	1クール	投与日 (day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考	
Cmab併用	Cmab単剤	7日	セツキシマブ	初回400mg/m ²	2時間	最小度	★【初回用】と【2回目以降】の2レジメン作成	
				以降250mg/m ²	1時間			
	Cmab+5-FU/CBDCA	21日	1,8,15	セツキシマブ	初回400mg/m ²	2時間	中等度	★
				以降250mg/m ²	1時間			
			1	カルボプラチン	AUC5	45分		
			1-4	フルオロウラシル	1000mg/m ²	24時間		
	Cmab+5-FU/CDDP	21日	1,8,15	セツキシマブ	初回400mg/m ²	2時間	高度	★
				以降250mg/m ²	1時間			
			1	シスプラチン	100mg/m ²	2時間		
			1-4	フルオロウラシル	1000mg/m ²	24時間		
	Cmab+weekly PTX	28日	1,8,15,22	セツキシマブ	初回400mg/m ²	2時間	軽度	★
				以降250mg/m ²	1時間			
1,8,15,22			パクリタキセル	80mg/m ²	1時間			
	(2週間) Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
	(4週間) Nivolumab	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度	
	PTX	49日	1,8,15,22,29,36	パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	軽度	
	(3週間) Pembrolizumab	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	最小度	
	(6週間) Pembrolizumab	42日	1	ペンブロリズマブ	400mg/body	30分	最小度	
	HER+DTX	21日	1	トラスツズマブ	初回8mg/kg	1.5時間	軽度	★
			以降6mg/kg	30分				
			1	ドセタキセル	70mg/m ² , 75歳以上は55mg/m ²	1時間		