

大腸がん

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	mFOLFOX6	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	中等度	
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	FOLFIRI	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	中等度	
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	XELOX	21日	1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	中等度	
			1タ-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服		
	SOX	21日	1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	中等度	
			1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
	IRIS	28日	1	イリノテカン	100mg/m ²	1.5時間	中等度	
			1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
	sLV5FU2	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	軽度	
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	CPT-11(150)	14日	1	イリノテカン	150mg/m ²	1.5時間	中等度	
BV併用				ペバシズマブ		*初回 1.5時間 2回目 1時間 以降 30分		
	BV+Capecitabine	21日	1	ペバシズマブ	7.5mg/kg	*	軽度	
			1タ-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服		
	BV+XELOX	21日	1	ペバシズマブ	7.5mg/kg	*	中等度	
				オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間		
			1タ-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服		
	【3週間】BV+IRIS	21日	1	ペバシズマブ	7.5mg/kg	*	中等度	
				イリノテカン	150mg/m ²	1.5時間		
			1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
	【4週間】BV+IRIS	28日	1, 15	ペバシズマブ	5mg/kg	*	中等度	
				イリノテカン	100mg/m ²	1.5時間		
			1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
	BV+SOX	21日	1	ペバシズマブ	7.5mg/kg	*	中等度	
				オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間		
			1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		

	BV+mFOLFOX6	14日	1	ペバシズマブ	5mg/kg	*	中等度	
				レボホリナート	200mg/㎡	2時間		
				オキサリプラチン	85mg/㎡	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/㎡	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/㎡	46時間		
	BV+FOLFIRI	14日	1	ペバシズマブ	5mg/kg	*	中等度	
				レボホリナート	200mg/㎡	2時間		
				イリノテカン	150mg/㎡	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/㎡	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/㎡	46時間		
	BV+sLV5FU2	14日	1	ペバシズマブ	5mg/kg	*	軽度	
				レボホリナート	200mg/㎡	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/㎡	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/㎡	46時間		
	BV+FOLFOXIRI	14日	1	ペバシズマブ	5mg/kg	*	中等度	
				イリノテカン	150mg/㎡	1.5時間		
				オキサリプラチン	85mg/㎡	2時間		
				レボホリナート	200mg/㎡	2時間		
				フルオロウラシル	2400mg/㎡	46時間		
	BV+TAS-102	28日	1,15	ペバシズマブ	5mg/kg	*	軽度	
			1-5, 8-12	トリフルリジン・チピラシル	70mg/㎡/日 分2	内服		
	BV+XELIRI	21日	1	ペバシズマブ	7.5mg/kg	*	中等度	
				イリノテカン	200mg/㎡	1.5時間		
			1タ-15朝	カペシタピン	800mg/㎡/回 1日2回	内服		
	BV+UFT/LV	28日	1.15	ペバシズマブ	5mg/kg	*	軽度	
			1-21.	テガフル・ウラシル	300mg/㎡/日	内服		
			1-21.	ホリナート	75mg/日			

Cmab併用	Cmab単剤	7日	1	セツキシマブ	** (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ²	**2時間 1時間	最小度	★【1回目専用】【2回目以降】レジメン有
		14日	1		500mg/m ²	2時間		
	Cmab+mFOLFOX6	14日	1, 8	セツキシマブ	**	**	中等度	★ 【点滴用】【バクスター用】 【1週間隔】 【2週間隔】レジメン有
			1		500mg/m ²	2時間		
			1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	Cmab+FOLFIRI	14日	1, 8	セツキシマブ	**	**	中等度	★ 【点滴用】【バクスター用】 【1週間隔】 【2週間隔】レジメン有
			1		500mg/m ²	2時間		
			1	レボホリナート	500mg/m ²	2時間		
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	Cmab+CPT-11	28日	1, 8, 15, 22	セツキシマブ	**	**	中等度	★ 【1週間隔】 【2週間隔】レジメン有
			1, 15		500mg/m ²	2時間		
			1, 15	イリノテカン	150mg/m ²	1.5時間		
	Cmab+Encorafenib +Binimetinib	7日	1	セツキシマブ	**	**	軽度	【1週間隔】 【2週間隔】レジメン有
			1-7.	エンコラフェニブ	300mg/回	1日1回		
			1-7.	ビニメチニブ	45mg/回	12時間毎		
		14日	1	セツキシマブ	500mg/m ²	2時間		
			1-14.	エンコラフェニブ	300mg/回	1日1回		
			1-14.	ビニメチニブ	45mg/回	12時間毎		
	Enco+Cmab+mFOLFOX6	14日	1-14.	エンコラフェニブ	300mg/回	1日1回	中等度	
			1	セツキシマブ	500mg/m ²	2時間		
			1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		

Pmab併用	Pmab単剤	14日	1	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	最小度	
	Pmab+mFOLFOX6	14日	1	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	中等度	
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	Pmab+FOLFIRI	14日	1	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	中等度	
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	Pmab+CPT-11	28日	1,15	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	中等度	
				イリノテカン	150mg/m ²	1.5時間		
	Pmab+IRIS	28日	1,15	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	中等度	
				イリノテカン	100mg/m ²	1.5時間		
			1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
	Pmab+Sotorasib	28日	1,15	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	最小度	
				ソトラシブ	960mg/body	内服		
AFL併用	AFL+FOLFIRI	14日	1	アフリベルセプト	4mg/kg	1時間	中等度	
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
RAM併用	RAM+FOLFIRI	14日	1	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間(2回目以降30分)	中等度	
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	【3週間】Pembrolizumab	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	最小度	
	【6週間】Pembrolizumab	42日	1	ペンブロリズマブ	400mg/body	30分	最小度	
	PER/HER	21日	1	ペルツズマブ	※初回: 840mg/body	※※初回: 1時間	最小度	☆【初回専用】【2回目以降】 【2回目以降/HER初回投与量】の3レジメン作成
					以降: 420mg/body	以降: 30分		
				トラスツズマブ	(初回)8mg/kg	(初回)1.5時間		
					(2回目以降)6mg/kg	(2回目以降)30分		

胃がん

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	S-1/CDDP	35日	1-21. 8	テガフル・ギメラシル・オテラシル シスプラチン	80mg/m ² /日 分2 60mg/m ²	内服 2時間	高度	
	S-1/DTX(40) 【術後補助】	21日	1タ-15朝 1	テガフル・ギメラシル・オテラシル ドセタキセル	80mg/m ² /日 分2 40mg/m ²	内服 1時間	軽度	【1コース目】S-1単剤(2投1休) 【2~7コース目】S-1(2投1休)、DTX(day1) 【8コース目以降】S-1単剤(4投2休)
	PTX	28日	1,8,15	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	軽度	
	CPT-11(150)	14日	1	イリノテカン	150mg/m ²	1.5時間	中等度	
	SOX	28日	1 1タ-15朝	オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	130mg/m ² 80mg/m ² /日 分2	2時間 内服	中等度	
	XELOX	21日	1 1タ-15朝	オキサリプラチン カベシタピン	130mg/m ² 1000mg/m ² /回 1日2回	2時間 内服	中等度	
	mFOLFOX6	14日	1	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	2時間 2時間 5分 46時間	中等度	
	Tislelizumab/XELOX	21日	1 1タ-15朝	チスレリズマブ オキサリプラチン カベシタピン	200mg/body 130mg/m ² 1000mg/m ² /回 1日2回	(初回)60分 2時間 内服	中等度	
HER併用	HER/Xeloda/CDDP	21日	1 1タ-15朝	トラスツズマブ シスプラチン カベシタピン	(初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg 80mg/m ² 1000mg/m ² /回 1日2回	(初回)1.5時間 (2回目以降)30分 2時間 内服	高度	★【初回専用】【2回目以降専用】有
	HER/mFOLFOX6	42日	1,22 1,15,29 1,15,29 1,15,29 1,15,29	トラスツズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	(初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	(初回)1.5時間 (2回目以降)30分 2時間 2時間 5分 46時間	day1,15,29 中等度 day22 最小度	【点滴用】【パクスター用】レジメン有 【初回専用】【2回目以降】有 HERのみ、FOLFOXのみ計4レジメン有
	HER/SOX	21日	1 1タ-15朝	トラスツズマブ オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	(初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg 130mg/m ² 80mg/m ² /日 分2	(初回)1.5時間 (2回目以降)30分 2時間 内服	中等度	★
	HER/XELOX	21日	1 1タ-15朝	トラスツズマブ オキサリプラチン カベシタピン	(初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg 130mg/m ² 1000mg/m ² /回 1日2回	(初回)1.5時間 (2回目以降)30分 2時間 内服	中等度	★
RAM併用	RAM単剤	14日	1	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間(2回目以降30分)	最小度	
	RAM/PTX	28日	1,15 1,8,15	ラムシルマブ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/m ²	1時間(2回目以降30分) 1時間	軽度	
	RAM/nab-PTX	28日	1,15 1,8,15	ラムシルマブ アルブミン懸濁型パクリタキセル	8mg/kg 100mg/m ²	1時間(2回目以降30分) 30分	軽度	
	RAM+TAS-102	28日	1,15 1-5, 8-12	ラムシルマブ トリフルリジン・チピラシル	8mg/kg 35mg/m ² /回 1日2回	1時間(2回目以降30分) 内服	中等度	

	T-DXd	21日	1	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	初回:1.5時間 以降:30分	中等度	
Zolbetuximab併用	【初回】 Zolbetuximab/FOLFOX	42日	1	ゾルベツキシマブ	800mg/m ²	*80ml/hrで開始、30分 毎に80ml/hrずつ up(320ml/hrまで)	day1,22高度 day15,29中等度	
			22	ゾルベツキシマブ	600mg/m ²	**60ml/hrで開始、30分 毎に60ml/hrずつ up(240ml/hrまで)		
			1,15,29	レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
			1,15,29	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
			1,15,29	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
			1,15,29	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	【2回目以降】 Zolbetuximab/FOLFOX	42日	1,22	ゾルベツキシマブ	600mg/m ²	**	day1,22高度 day15,29中等度	
			1,15,29	レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
			1,15,29	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
			1,15,29	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
			1,15,29	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	【初回】 Zolbetuximab/XELOX	21日	1	ゾルベツキシマブ	800mg/m ²	*	高度	
			1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間		
			1ター-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服		
	【2回目以降】 Zolbetuximab/XELOX	21日	1	ゾルベツキシマブ	600mg/m ²	**	高度	
			1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間		
			1ター-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服		
Nivolumab併用	【2週間】Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
	【4週間】Nivolumab	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度	
	Nivolumab/SOX	21日	1	ニボルマブ	360mg/day	30分	中等度	
			1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間		
			1ター-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
	Nivolumab/XELOX	21日	1	ニボルマブ	360mg/day	30分	中等度	
			1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間		
			1ター-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服		
	Nivolumab/mFOLFOX6	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	中等度	【点滴用】【バクスター用】レジメン有
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		

Pembrolizumab併用	Pembrolizumab/SOX	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	中等度	Pembrolizumabは35コースまで
			1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間		
			1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
	HER/Pembro/SOX/3W	21日	1	トラスツズマブ	(初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg	(初回)1.5時間 (2回目以降)30分	中等度	★【初回専用】【2回目以降専用】有
			1	ペンブロリズマブ	200mg	30分		
			1	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間		
			1タ-15朝	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
	HER/Pembro/CapeOX	21日	1	トラスツズマブ	(初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg	(初回)1.5時間 (2回目以降)30分	中等度	★
				ペンブロリズマブ	200mg	30分		
				オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間		
			1タ-15朝	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服		
Durvalumab併用	D-FLOT	28	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20mg/kg)	1時間	中等度	【点滴用】【バクスター用】レジメン有 術前・術後 各2コース
			1,15	ドセタキセル	50mg/m ²	1時間		
				レボホリナート	100mg/m ²	2時間		
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	2600mg/m ²	24時間		
	Durvalumab	28	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20mg/kg)	1時間	最小度	術後最大10コース

食道がん

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	DCF【進行再発】	28日	1,15	ドセタキセル	30mg/m ²	1時間	高度	
			1-5.	フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間		
			1	シスプラチン	80mg/m ²	2時間		
	DTX	21日	1	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	軽度	
	mFOLFOX6	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	中等度	
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	FOLFOX+RT	14日	1	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	中等度	最大6コース
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	1600mg/m ²	46時間		
	PTX	49日	1,8,15,22,29,36	パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	軽度	
	Tislelizumab	21日	1	チスレリズマブ	200mg/body	(初回)60分 (2回目以降)30分	最小度	
Nivolumab併用	【2週間】Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
	【4週間】Nivolumab	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度	
	【2週間】Nivolumab【術後】	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	12ヶ月間まで
	【4週間】Nivolumab【術後】	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度	12ヶ月間まで
	Nivolumab+Ipilimumab	42日	1,22	ニボルマブ	360mg/body	30分	最小度	
			1	イピリムマブ	1mg/kg	30分		
	【3週間】Pembrolizumab	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	最小度	
	【6週間】Pembrolizumab	42日	1	ペンブロリズマブ	400mg/body	30分	最小度	

肝胆膵がん

レジメン名	1クール	投与日 (day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考	
肝細胞癌	Atezolizumab+BV	21日	1	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	(初回)60分 (初回)90分	最小度	
	RAM	14日	1	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間(2回目以降30分)	最小度	
	Durvalumab + Tremelimumab	28日	1	トレメリムマブ	300mg/body(30kg以下:4mg/kg)	1時間	最小度	Tremelimumabは初回1回のみ
			1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20mg/kg)	1時間		
	Durvalumab	28日	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20mg/kg)	1時間	最小度	
	Nivolumab+Ipilimumab	21日	1	ニボルマブ	80mg/body	30分	最小度	
			1	イピリムマブ	3mg/kg	30分		
	【2週間】Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
	【4週間】Nivolumab	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度	
胆道癌	CDDP/GEM	21日	1,8	シスプラチン	25mg/m ²	1時間15分	中等度	
				ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分		
	GEM+S-1	21日	1,8	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	中等度	
			1-14.	テガフル・ギメラシル・オテラシル	60-100mg/m ² /日 分2	内服		
	GCS (GEM+CDDP+S-1)	14日	1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	中等度	
			1	シスプラチン	25mg/m ²	1時間15分		
			1-7.	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
	Durvalumab+CDDP+GEM	21日	1	デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	中等度	
			1,8	シスプラチン	25mg/m ²	1時間		
			1,8	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分		
	Durvalumab	28日	1	デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	最小度	
	maintenance:Pembrolizumab+GEM	21日	1	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	軽度	
			1,8	ゲムシタピン	1000mg/m ² /日	30分		
Pembrolizumab+CDDP+GEM	21日	1	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	中等度		
		1,8	シスプラチン	25mg/m ²	1時間			
		1,8	ゲムシタピン	1000mg/m ² /日	30分			
膵癌	Modified FOLFIRINOX	14日	1	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	高度	【点滴用】【バクスター用】レジメン有
				イリノテカン	150mg/m ²	2時間		
				レボホリナート	200mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		
	GEM	28日	1,8,15	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	軽度	
	【術前】GEM+S-1	21日	1,8	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	軽度	
			1-14.	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服		
	nab-PTX/GEM	28日	1,8,15	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	30分	軽度	
				ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分		
	nal-IRI+5FU/LV	14日	1	イリノテカン(リボソーム製剤)	70mg/m ²	90分	中等度	
レボホリナート				200mg/m ²	2時間			
フルオロウラシル				2400mg/m ²	46時間			

その他

膵・消化管神経内分泌腫瘍

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	【weekly】STZ(1000)	7日	1	ストレプトゾシン	1000mg/m ²	30分	高度	
	【weekly】STZ(1250)	7日	1	ストレプトゾシン	1250mg/m ²	30分	高度	増量基準あり
	【weekly】STZ(1500)	7日	1	ストレプトゾシン	1500mg/m ²	30分	高度	増量基準あり

小腸癌

	mFOLFOX6	14日	1	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	中等度	【点滴用】【バクスター用】レジメン有
				オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間		
				フルオロウラシル	400mg/m ²	5分		
				フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間		