

骨髄異形成症候群

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	sc-AZA	28日	1-7	アザシチジン	75mg/m ²	皮下注	中等度	入院・外来あり

多発性骨髄腫

レジメン名	1クール	投与日(day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	sc-Bortezomib 4/3W	21日	1,4,8,11	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注	最小度
	sc-Bortezomib 4/5W	35日	1,8,15,22	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注	最小度
	PBd(1~8コース目)	21日	1,4,8,11	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注	最小度
			1-21	ボマリドミド	4mg/body	内服	
			1,2,4,5,8,9,11,12	デキサメタゾン	20mg/body	内服	
	PBd(9コース目以降)	21日	1,8	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注	最小度
			1-14	ボマリドミド	4mg/body	内服	
			1,2,8,9	デキサメタゾン	20mg/body	内服	
Daratumumab 併用レジメン	D-VMP(1コース目)(S.C.)	42日	1,8,15,22,29,36	ダラツマブ	1800mg/body	3~5分かけて投与	中等度
			1,4,8,11,22,25,29,32	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注	
			1-4.	メルファラン	9mg/m ²	内服	
			2-4.	ブレドニゾン	60mg/m ²	内服	
	D-VMP(2~9コース目)(S.C.)	42日	1,22	ダラツマブ	1800mg/body	3~5分かけて投与	中等度
			1,8,22,29	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注	
			1-4.	メルファラン	9mg/m ²	内服	
			2-4.	ブレドニゾン	60mg/m ²	内服	
	D-VMP(10コース目以降)(S.C.)	28日	1	ダラツマブ	1800mg/body	3~5分かけて投与	最小度
	DBd(1~3コース目)(S.C.)	21日	1,8,15	ダラツマブ	1800mg/body	3~5分かけて投与	最小度
			1,4,8,11	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注	
			1,2,4,5,8,9,11,12,15	デキサメタゾン	20mg/body	内服	
	DBd(4~8コース目)(S.C.)	21日	1	ダラツマブ	1800mg/body	3~5分かけて投与	最小度
			1,4,8,11	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注	
			1,2,4,5,8,9,11,12	デキサメタゾン	20mg/body	内服	
	DBd(9コース目以降)(S.C.)	28日	1	ダラツマブ	1800mg/body	3~5分かけて投与	最小度
	DKd(1コース目)(S.C.)	28日	1,8,15,22	ダラツマブ	1800mg/body	3~5分かけて投与	最小度
			1,2	カルフィルゾミブ	20mg/m2	30分	
			8,9,15,16	カルフィルゾミブ	56mg/m2	30分	
			1,2,8,9,15,16,22,23	デキサメタゾン	20mg/body	内服	
	DKd(2コース目)(S.C.)	28日	1,8,15,22	ダラツマブ	1800mg/body	3~5分かけて投与	最小度
			1,2,8,9,15,16	カルフィルゾミブ	56mg/m2	30分	
			1,2,8,9,15,16,22,23	デキサメタゾン	20mg/body	内服	
	DKd(3~6コース目)(S.C.)	28日	1,15	ダラツマブ	1800mg/body	3~5分かけて投与	最小度
			1,2,8,9,15,16	カルフィルゾミブ	56mg/m2	30分	
			1,2,8,9,15,16,22,23	デキサメタゾン	20mg/body	内服	
	DKd(7コース目以降)(S.C.)	28日	1	ダラツマブ	1800mg/body	3~5分かけて投与	最小度
			1,2,8,9,15,16	カルフィルゾミブ	56mg/m2	30分	
			1,2,8,9,15,16,22,23	デキサメタゾン	20mg/body	内服	

	DLd(1～2コース目)(S.C.)	28日	1,8,15,22	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	最小度	
			1,2,8,9,15,16,22,23	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
	DLd(3～6コース目)(S.C.)	28日	1,15	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	最小度	
			1,2,15,16	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			8,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
	DLd(7コース目以降)(S.C.)	28日	1	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	最小度	
			1,2	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
	DPd(1～2コース目)(S.C.)	28日	1,8,15,22	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	最小度	
			<75歳未満>	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			1-21	ボマリドミド	4mg/body	内服		
	DPd(3～6コース目)(S.C.)	28日	1,15	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	最小度	
			<75歳未満>	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			1,2,15,16					
			<75歳未満>	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
			8,22					
			1-21	ボマリドミド	4mg/body	内服		
	DPd(7コース目以降)(S.C.)	28日	1	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	最小度	
			<75歳未満>	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			1,2					
			<75歳以上>					
			1,8,15,22					
			<75歳未満>	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
	《移植適応》 DaraVRd/4W(1～2コース目)	28日	1,8,15,22	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	軽度	
			1,4,8,11	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下注		
			1-4,9-12	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
	《移植適応》 DaraVRd/4W(3～6コース目)	28日	1,15	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	軽度	
			1,4,8,11	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下注		
			1-4,9-12	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
	《移植適応》 DaraVRd/4W(7コース目以降)	28日	1	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	軽度	
			1-21	レナリドミド	10mg/body	内服		
	《移植非適応》 DaraVRd/3W(1～2コース目)	21日	1,8,15	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	軽度	
			1,4,8,11	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下注		
			1,2,4,5,8,9,11,12,15	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			1-14	レナリドミド	25mg/body	内服		

	《移植非適応》 DaraVRd/3W(3～8コース目)	21日	1	ダラツマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	軽度		
			1,4,8,11	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下注			
			1,2,4,5,8,9,11,12	デキサメタゾン	20mg/body	内服			
			1-14	レナリドミド	25mg/body	内服			
	《移植非適応》 DaraVRd/4W(9コース目以降)	28日	1	ダラツマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	軽度		
			1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服			
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服			
	Elotuzumab 併用レジメン				エロツズマブ	10mg/kg	** (1コース目初回) 最初の30分は30ml/hr、30～60分は 60ml/hr、60分以降は120ml/hr (MAX:120ml/hr) (1コース目2回目) 最初の30分は180ml/hr、30分以降は 240ml/hr (MAX:240ml/hr) (1コース目3回目以降) 300ml/hr (MAX:300ml/hr)	20mg/kg	*** (3コース目) 最初の30分は 180ml/hr、30分以降 は240ml/hr (MAX:240ml/hr) (4コース目以降) 300ml/hr (MAX:300ml/hr)
ELd(1～2コース目)		28日	1,8,15,22	エロツズマブ	10mg/kg	**	最小度		
			1,8,15,22	デキサメタゾン	28mg/body	内服			
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服			
ELd(3コース目以降)		28日	1,15	エロツズマブ	10mg/kg	**	最小度		
			1,15	デキサメタゾン	28mg/body	内服			
			8,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服			
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服			
EPD(1～2コース目)		28日	1,8,15,22	エロツズマブ	10mg/kg	**	最小度		
			1,8,15,22	デキサメタゾン	28mg/body	内服			
			1-21	ボマリドミド	4mg/body	内服			
EPD(3コース目以降)		28日	1	エロツズマブ	20mg/kg	***	最小度		
			1	デキサメタゾン	28mg/body	内服			
			8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服			
			1-21	ボマリドミド	4mg/body	内服			
Isatuximab 併用レジメン					イサツキシマブ		☆(初回)最初の1時間は25mL/hr、以降 30分毎に25mL/hずつup (MAX:150mL/hr) (2回目投与) 最初の30分は50mL/hr、30～60分: 100mL/h、60分以降: 200mL/hr (3回目以降) 200mL/hr		
		IKD(1コース目)	28日	1,8,15,22	イサツキシマブ	10mg/kg	☆	軽度	
				1,2	カルフィルゾミブ	20mg/m2	30分		
				8,9,15,16	カルフィルゾミブ	56mg/m2			
				1,2,8,9,15,16,22,23	デキサメタゾン	20mg/body	内服		

	IKD(2コース目以降)	28日	1,15	イサツキシマブ	10mg/kg	☆	軽度	
			1,2,8,9,15,16	カルフィルゾミブ	56mg/m2	30分		
			1,2,8,9,15,16,22,23	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
	IPD(1コース目)	28日	1,8,15,22	イサツキシマブ	10mg/kg	☆	軽度	
			1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
			1-21	ボマリドミド	4mg/body	内服		
	IPD(2コース目以降)	28日	1,15	イサツキシマブ	10mg/kg	☆	軽度	
			1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
			1-21	ボマリドミド	4mg/body	内服		
	Isa-d(1コース目)	28日	1,8,15,22	イサツキシマブ	20mg/kg	☆	軽度	
			1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
	Isa-d(2コース目以降)	28日	1,15	イサツキシマブ	20mg/kg	☆	軽度	
			1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
	IsaVRd/6W(1コース目)	42日	1,8,15,22,29	イサツキシマブ	10mg/kg	☆	軽度	
			1,4,8,11,22,25,29,32	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下注		
			1,2,4,5,8,9,11,12,15,22,23,25,26,29,30,32,33	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			1-14,22-35	レナリドミド	25mg/body	内服		
	IsaVRd/6W(2~4コース目)	42日	1,15,29	イサツキシマブ	10mg/kg	☆	軽度	
			1,4,8,11,22,25,29,32	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下注		
			1,2,4,5,8,9,11,12,15,22,23,25,26,29,30,32,33	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			1-14,22-35	レナリドミド	25mg/body	内服		
	IsaVRd/4W(5~17コース目)	28日	1,15	イサツキシマブ	10mg/kg	☆	軽度	
			1,8,15,22	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
	IsaVRd/4W(18コース目以降)	28日	1	イサツキシマブ	10mg/kg	☆	軽度	
			1,8,15,22	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
Carfilzomib 併用レジメン	KRd(1コース目)	28日	1,2	カルフィルゾミブ	20mg/m2	30分	最小度	
			8,9,15,16	カルフィルゾミブ	27mg/m2	30分		
			1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
			2,9,16	デキサメタゾン	4mg/body	内服		
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
	KRd(2~12コース目)	28日	1,2,8,9,15,16	カルフィルゾミブ	27mg/m2	30分	最小度	
			1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
			2,9,16	デキサメタゾン	4mg/body	内服		
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
	KRd(13~18コース目)	28日	1,2,15,16	カルフィルゾミブ	27mg/m2	30分	最小度	
			1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
			2,16	デキサメタゾン	4mg/body	内服		
			1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		

	Kd(1コース目)	28日	1,2	カルフィルゾミブ	20mg/m2	30分	最小度	
			8,9,15,16	カルフィルゾミブ	56mg/m2	30分		
			1,2,8,9,15,16,22,23	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
	Kd(2コース目以降)	28日	1,2,8,9,15,16	カルフィルゾミブ	56mg/m2	30分	最小度	
			1,2,8,9,15,16,22,23	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
	【週1回投与】Kd(1コース目)	28日	1	カルフィルゾミブ	20mg/m2	30分	最小度	
			8,15	カルフィルゾミブ	70mg/m2	30分		
			1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
	【週1回投与】Kd(2コース目以降)	28日	1,8,15	カルフィルゾミブ	70mg/m2	30分	最小度	
			1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
	Elranatamab(用量漸増期)	7日	1	エルラナタマブ	12mg/body	皮下注	最小度	
			4	エルラナタマブ	32mg/body	皮下注		
	【1週間間隔】Elranatamab	28日	1,8,15,22	エルラナタマブ	76mg/body	皮下注	最小度	
	【2週間間隔】Elranatamab	28日	1,15	エルラナタマブ	76mg/body	皮下注	最小度	
	【4週間間隔】Elranatamab	28日	1	エルラナタマブ	76mg/body	皮下注	最小度	
	【漸増期】Teclistamab	11日	1	テクリスタマブ	0.06mg/kg	皮下注	最小度	
			3	テクリスタマブ	0.3mg/kg	皮下注		
			5	テクリスタマブ	1.5mg/kg	皮下注		
	【1週間間隔】《継続投与期》 Teclistamab	28日	1,8,15,22	テクリスタマブ	1.5mg/kg	皮下注	最小度	
	【2週間間隔】《継続投与期》 Teclistamab	28日	1,15	テクリスタマブ	1.5mg/kg	皮下注	最小度	
	【1週間間隔】《漸増期》 Talquetamab	11日	1	トアルクエタマブ	0.01mg/kg	皮下注	最小度	
			3	トアルクエタマブ	0.06mg/kg	皮下注		
			5	トアルクエタマブ	0.4mg/kg	皮下注		
	【1週間間隔】《継続投与期》 Talquetamab	11日	1,8,15,22	トアルクエタマブ	0.4mg/kg	皮下注	最小度	
	【2週間間隔】《漸増期》 Talquetamab	20日	1	トアルクエタマブ	0.01mg/kg	皮下注	最小度	
			3	トアルクエタマブ	0.06mg/kg	皮下注		
			5	トアルクエタマブ	0.4mg/kg	皮下注		
			7	トアルクエタマブ	0.8mg/kg	皮下注		
	【2週間間隔】《継続投与期》 Talquetamab	28日	1,15	トアルクエタマブ	0.8mg/kg	皮下注	最小度	
	《漸増期》 Teclistamab+Talquetamab	21日	1	テクリスタマブ	0.06mg/kg	皮下注	最小度	
			3	テクリスタマブ	0.3mg/kg	皮下注		
			5	テクリスタマブ	1.5mg/kg	皮下注		
			7	テクリスタマブ	3mg/kg	皮下注		
			1	トアルクエタマブ	0.01mg/kg	皮下注		
			3	トアルクエタマブ	0.06mg/kg	皮下注		
			5	トアルクエタマブ	0.4mg/kg	皮下注		
			7	トアルクエタマブ	0.8mg/kg	皮下注		
	【2週間間隔】《継続投与期》 Teclistamab+Talquetamab	28日	1,15	テクリスタマブ	3mg/kg	皮下注	最小度	
			1,15	トアルクエタマブ	0.8mg/kg	皮下注		
	【4週間間隔】《継続投与期》 Teclistamab+Talquetamab	28日	1	テクリスタマブ	3mg/kg	皮下注	最小度	
			1	トアルクエタマブ	0.8mg/kg	皮下注		

BelaBd(1～8コース目)	21日	1	ベランタマブ マホドチン	2.5mg/kg	30分	最小度	
		1,4,8,11	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注		
		1,2,4,5,8,9,11,12	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
BelaBd(9コース目)	21日	1	ベランタマブ マホドチン	2.5mg/kg	30分	最小度	
BelaPd(1コース目)	21日	1	ベランタマブ マホドチン	2.5mg/kg	30分	最小度	
		1-21	ボマリドミド	4mg/body	内服		
		1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
BelaPd(2コース目以降)	21日	1	ベランタマブ マホドチン	1.9mg/kg	30分	最小度	
		1-21	ボマリドミド	4mg/body	内服		
		1,8,15,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		

ALアミロイドーシス

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	D-VCD(1～2コース目)	28日	1,8,15,22	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	最小度	
			1,8,15,22	シクロホスファミド	300mg/m ² (最大500mg/回)	内服		
			1,8,15,22	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注		
			1,2,8,9,15,16,22,23	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
	D-VCD(3～6コース目)	28日	1,15	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	最小度	
			1,8,15,22	シクロホスファミド	300mg/m ² (最大500mg/回)	内服		
			1,8,15,22	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注		
			1,2,15,16	デキサメタゾン	20mg/body	内服		
			8,22	デキサメタゾン	40mg/body	内服		
	D-VCD(7コース目以降)	28日	1	ダラツムマブ	1800mg/body	3～5分かけて投与	最小度	

ホジキンリンパ腫

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	Brentuximab Bedotin	21日	1	ブレンツキシマブベドチン	1.8mg/kg (max:180mg/body)	30分	軽度	
	BV-AVD	28日	1,15	ドキソルビシン	25mg/m ²	30分	高度	
				ビンブラスチン	6mg/m ²	5分		
				ダカルバジン	375mg/m ²	30分		
				ブレンツキシマブベドチン	1.2mg/kg (max:120mg/body)	30分		
	Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
	【3週間】Pembrolizumab	21日	1	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	最小度	
	【6週間】Pembrolizumab	42日	1	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	最小度	

非ホジキンリンパ腫

レジメン名	1クール	投与日 (day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
Bendamustine (120)	21日	1,2	ベンダムスチン	120mg/m ²	10分	中等度	
Brentuximab Vedotin	21日	1	ブレンツキシマブベドチン	1.8mg/kg (max:180mg/body)	30分	軽度	
BV-CHP	21日	1	ブレンツキシマブベドチン	1.8mg/kg (max:180mg/body)	30分	高度	
		1	ドキシソルピシン	50mg/m ²	30分		
		1	シクロホスファミド	750mg/m ²	30分		
		1-5	ブレドニゾロン	60mg/m ²	内服		
CHOP	21日	1	ピンクリスチン	1.4mg/m ²	5分	高度	
		1	ドキシソルピシン	50mg/m ²	30分		
		1	シクロホスファミド	750mg/m ²	30分		
		1-5	ブレドニゾロン	60mg/m ²	内服		
Mogamulizumab	7日	1	モガムリズマブ	1mg/kg	2時間	最小度	
Pralatrexate	49日	1,8,15,22,29,36	プラトレキサート	30mg/m ²	5分	軽度	
Romidepsin	28日	1,8,15	ロミデプシン	14mg/m ²	4時間	軽度	
【1コース目】Epcoritamab	28日	1	エプコリタマブ	0.16mg	皮下注	軽度	
		8		0.8mg	皮下注		
		15,22		48mg	皮下注		
【FL1～3A】 【1コース目】Epcoritamab	28日	1	エプコリタマブ	0.16mg	皮下注		
		8		0.8mg	皮下注		
		15		3mg	皮下注		
		22		48mg	皮下注		
【2～3コース目】Epcoritamab	28日	1,8,15,22	エプコリタマブ	48mg	皮下注		
【4～9コース目】Epcoritamab	28日	1,15	エプコリタマブ	48mg	皮下注		
【10コース目以降】Epcoritamab	28日	1	エプコリタマブ	48mg	皮下注		
【1コース目】Mosunetuzumab(S.C.)	21日	1	モスネツズマブ	5mg	皮下注	軽度	
		8,15		45mg	皮下注		
【2～17コース目】Mosunetuzumab(S.C.)	21日	1	モスネツズマブ	60mg	皮下注		
【1コース目】Mosun(SC)+Pola	21日	1	モスネツズマブ	5mg	皮下注	軽度	
		8,15		45mg	皮下注		
		1	ボラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg	***		
【2～6コース目】Mosun(SC)+Pola	21日	1	モスネツズマブ	45mg	皮下注	軽度	
		1	ボラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg	***		
【7～8コース目】Mosun(SC)+Pola	21日	1	モスネツズマブ	45mg	皮下注	軽度	
【1コース目】Tafasitamab+Lenalidomide	28日	1,4,8,15,22	タファシタマブ	12mg/kg	*****(初回)70mL/hで開始。30分後125mL/hにup (2回目以降)125mL/h	軽度	
		1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
【2～3コース目】Tafasitamab+Lenalidomide	28日	1,8,15,22	タファシタマブ	12mg/kg	****	軽度	
		1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
【4コース目以降】Tafasitamab+Lenalidomide	28日	1,15	タファシタマブ	12mg/kg	****	軽度	レナリドミドは12コース目まで
		1-21	レナリドミド	25mg/body	内服		
【3週間】Pembrolizumab	21日	1	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	最小度	
【6週間】Pembrolizumab	42日	1	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	最小度	

R併用	Rituximab	7日	1	リツキシマブ	375mg/m ²	*(初回投与)最初の30分は50mL/hr、 30分毎に50mL/hrずつup(MAX400mL/hr) (2回目以降)最初の30分は100mL/hr、 30分毎に100mL/hrずつup(MAX400mL/hr)	最小度	
	R-Bendamustine(90) 2/4W	28日	1	リツキシマブ	375mg/m ²	*	中等度	
			1,2	ベンダムスチン	90mg/m ²	10分		
	R-CHOP	21日	1	リツキシマブ	375mg/m ²	*	高度	
			1	ビンクリスチン	1.4mg/m ² (max:2mg/body)	5分		
			1	ドキシソルピシン	50mg/m ²	30分		
			1	シクロホスファミド	750mg/m ²	30分		
			1-5	ブレドニゾロン	60mg/m ²	内服		
	Pola-BR(1.8/90/375) 2/4W.	28日	1	リツキシマブ	375mg/m ²	*	中等度	
			1,2	ベンダムスチン	90mg/m2	10分		
			1	ボラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg	***40mL/hr(初回90分) 120mL/hr(2回目以降のため30分)		
	Pola-R-CHP	21日	1	リツキシマブ	375mg/m ²	*	高度	
			1	ボラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg	***		
			1	ドキシソルピシン	50mg/m ²	30分		
			1	シクロホスファミド	750mg/m ²	30分		
			1-5	ブレドニゾロン	60mg/m ²	内服		
	R-COPE/3W	21日	1	リツキシマブ	375mg/m ²	*	中等度	
			1	ビンクリスチン	1.4mg/m ² (max:2mg/body)	5分		
			1	シクロホスファミド	750mg/m ²	30分		
			1	エトポシド	50mg/m ²	1時間		
			2,3	エトポシド	100mg/m ²	内服		
			1-5	ブレドニゾロン	60mg/m ²	内服		
	Rituximab+Lenalidomide (1コース目)	28日	1,8,15,22	リツキシマブ	375mg/m ²	*	軽度	
			1-21	レナリドミド	20mg/body	内服		
	Rituximab+Lenalidomide (2~5コース目)	28日	1	リツキシマブ	375mg/m ²	*	軽度	
			1-21	レナリドミド	20mg/body	内服		
	Rituximab+Lenalidomide (6~12コース目)	28日	1-21	レナリドミド	20mg/body	内服	軽度	
	【1コース目】Tafasitamab+R2	28日	1,8,15,22	タファシタマブ	12mg/kg	****	軽度	
			1,8,15,22	リツキシマブ	375mg/m ²	*		
			1-21	レナリドミド	20mg/body	内服		
	【2~3コース目】Tafasitamab+R2	28日	1,8,15,22	タファシタマブ	12mg/kg	****	軽度	
			1	リツキシマブ	375mg/m ²	*		
			1-21	レナリドミド	20mg/body	内服		
	【4~5コース目】Tafasitamab+R2	28日	1,15	タファシタマブ	12mg/kg	****	軽度	
			1	リツキシマブ	375mg/m ²	*		
			1-21	レナリドミド	20mg/body	内服		
	【6~12コース目】Tafasitamab+R2	28日	1,15	タファシタマブ	12mg/kg	****	軽度	
			1-21	レナリドミド	20mg/body	内服		

G併用	【1コース目専用】 Obinutuzumab	21日	1,8,15	オビヌツズマブ	1000mg/body	** (1コース目初回/前回G3以上のIR) 最初の30分は10mL/hr、30分毎に10mL/hrずつup (MAX100mL/hr) (1コース目2回目以降) 最初の30分は25mL/hr、30分毎に25mL/hrずつup (MAX100mL/hr) (2コース目以降) 最初の30分は25mL/hr、投与開始30～90分は MAX100mL/hr、投与開始90分以降はMAX200mL/hr	最小度	
	【2回目以降】 G-Bendamustine 2/4W	28日	1	オビヌツズマブ	1000mg/body	**	中等度	
			1,2	ベンダムスチン	90mg/m ²	10分		
	【2コース目以降】 G-CHOP	21日	1	オビヌツズマブ	1000mg/body	**	高度	
			1	ビンクリスチン	1.4mg/m ² (max:2mg/body)	5分		
			1	ドキシソルピシン	50mg/m ²	30分		
			1	シクロホスファミド	750mg/m ²	30分		
			1-5	プレドニゾン	60mg/m ²	内服		
	【2コース目以降】 G-CVP	21日	1	オビヌツズマブ	1000mg/body	**	高度	
			1	ビンクリスチン	1.4mg/m ² (max:2mg/body)	5分		
			1	シクロホスファミド	750mg/m ²	30分		
			1-5	プレドニゾン	60mg/m ²	内服		
	G維持療法	56日	1	オビヌツズマブ	1000mg/body	**	最小度	

急性前骨髄球性白血病

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	(寛解後)ATO	35日	25回/5W	三酸化ヒ素	0.15mg/kg	2時間	中等度	

慢性リンパ性白血病

レジメン名	1クール	投与日(day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
Acalabrutinib+Obinutuzumab (1コース目)	28日	1-28	アカラブルチニブ	200mg 分2	内服	最小度	
Acalabrutinib+Obinutuzumab (2コース目)	28日	1-28 1,2,8,15	アカラブルチニブ オビヌツズマブ	200mg 分2 d1:100mg/body d2:900mg/body d8,15:1000mg/body	内服 d1:4時間 d2,8,15: **(2コース目2回目/前回IR発現) 最初の30分は10mL/hr、30分毎に10mL/hr ずつup 最大100mL/hrまで (2コース目3回目以降) 最初の30分は25mL/hr、30分毎に25mL/hr ずつup 最大100mL/hrまで	最小度	
Acalabrutinib+Obinutuzumab (3～7コース目)	28日	1-28 1	アカラブルチニブ オビヌツズマブ	200mg 分2 1000mg/body	内服 **	最小度	
Acalabrutinib+Obinutuzumab (8コース目以降)	28日	1-28	アカラブルチニブ	200mg 分2	内服	最小度	
VenR (用量漸増期)	35日	1-35	ペネトクラクス	d1-7:20mg 分1 d8-14:50mg 分1 d15-21:100mg 分1 d22-28:200mg 分1 d29-35:400mg 分1	内服	最小度	
VenR (1コース目)	28日	1-28 1	ペネトクラクス リツキシマブ	400mg 分1 375mg/m ²	内服 **(初回投与)最初の30分は50mL/hr、30分 毎に50mL/hrずつup	最小度	
VenR (2～6コース目)	28日	1-28 1	ペネトクラクス リツキシマブ	400mg 分1 500mg/m ²	内服 *** (2回目以降)最初の30分は100mL/hr、 30分毎に100mL/hrずつup	最小度	7コース目以降、 ペネトクラクス単 剤(最長24ヵ月)